

Paraceta 500 Paracetamol 500 mg Tabletten

Wirkst.: Paracetamol. **Zusammens.:** 1 Tablette enthält: *Arzneil. wirks. Bestandt.:* 500 mg Paracetamol. *Sonst. Bestandt.:* Povidon K 30, Maisstärke, Natriumcboxymethylstärke, vorverkleisterte Stärke aus Mais, Stearinsäure (Ph. Eur.), Propyl-4-hydroxybenzoat, Ethyl-4-hydroxybenzoat. **Anw.-geb.:** Symptomatische Behandlung leichter bis mäßig starker Schmerzen und/oder von Fieber. Paraceta 500 kann bei Kindern ab 4 Jahren und Erwachsenen angewendet werden. **Gegenanz.:** Überempfindlichkeit gegen Paracetamol, Propyl-4-hydroxybenzoat, Ethyl-4-hydroxybenzoat oder einen der anderen sonstigen Bestandteile dieses Arzneimittels. **Nebenw.:** *Leber- und Gallenerk.:* Selten Anstieg der Lebertransaminasen. *Erk. d. Bluts u. d. Lymphsyst.:* Sehr selten Veränderungen d. Blutbildes wie Thrombozytopenie, Agranulozytose. *Erk. d. Immunsystems:* Sehr selten bei prädisp. Personen Bronchospasmus (Analgetika-Asthma), Überempfindlichkeitsrkt. von einfacher Hautrötung bis hin zu Urtikaria u. anaphylaktischem Schock. *Erk. d. Haut u. d. Unterhautzellgewebes:* Selten Hautausschlag, Juckreiz, Erythem, Urtikaria. Sehr selten schwere Hautrkt. (Stevens-Johnson-Syndrom, toxische epidermale Nekrolyse). Propyl-4-hydroxybenzoat und Ethyl-4-hydroxybenzoat können Überempfindlichkeitsreaktionen, auch mit zeitlicher Verzögerung, hervorrufen. Hinweise in der Fachinformation beachten. **Apothekenpflichtig.**

Zentiva Pharma GmbH, 65927 Frankfurt am Main.

Stand: Juli 2019