

Desloratadin-ADGC® 5 mg Filmtabletten

Wirkst.: Desloratadin. **Zusammens.:** 1 Filmtablette Desloratadin-ADGC enthält: *Arzneil. wirks. Bestandt.:* 5 mg Desloratadin. *Sonst. Bestandt.:* Calciumhydrogenphosphat-Dihydrat, mikrokristalline Cellulose, Maisstärke, Talkum, Magnesiumstearat, Hypromellose 2910, Macrogol 400, Titandioxid, Indigocarmin-Aluminiumsalz. **Anw.-geb.:** Bei Erwachsenen und Jugendlichen ab 12 Jahren zur Besserung der Symptomatik bei allergischer Rhinitis, Urtikaria. **Fertilität, Schwangersch. u. Stillz.:** Die Einnahme von Desloratadin-ADGC in der Schwangerschaft und Stillzeit wird nicht empfohlen. Daten zur Fortpflanzungsfähigkeit bei Männern und/oder Frauen liegen nicht vor. **Nebenw.:** *Stoffwechsel- u. Ernährungsstör.:* Nicht bekannt Gesteigerter Appetit. *Psychiatr. Erkr.:* Sehr selten Halluzinationen. Nicht bekannt anomales Verhalten, Aggression. *Erkr. d. Nervensys.:* Häufig Kopfschmerzen Sehr selten Schwindel, Somnolenz, Schlaflosigkeit, psychomotorische Hyperaktivität, Krampfanfälle. *Herzerkr.:* Sehr selten Tachykardie, Palpitationen. Nicht bekannt QT-Verlängerung. *Erkr. d. Gastrointestinaltrakts* Häufig Trockener Mund. Sehr selten Bauchschmerzen, Übelkeit, Erbrechen, Dyspepsie, Diarrhö. *Leber- u. Gallenerkr.* Sehr selten Leberenzym erhöhungen, erhöhtes Bilirubin. Nicht bekannt Hepatitis Ikterus. *Erkr. d. Haut u. d. Unterhautzellgewebes* Nicht bekannt Fotosensibilität. *Skelettmusk.-, Bindegewebs- u. Knochenkr.:* Sehr selten Myalgie. *Allg. Erkr. u. Beschwerden am Verabreichungsort* Häufig Ermüdung. Selten Überempfindlichkeitsreaktionen. Nicht bekannt Asthenie. *Untersuchungen* Nicht bekannt Gewichtszunahme. *Weitere Nebenwirkungen bei Kindern und Jugendlichen:* Nicht bekannt QT-Verlängerung, Arrhythmie, Bradykardie, anomales Verhalten und Aggression

Hinweise in der Fachinformation beachten. **Apothekenpflichtig.**

Pharmazeutischer Unternehmer: **Zentiva Pharma GmbH**, 65927 Frankfurt am Main.

Stand: Dezember 2020