


Frauen

Behandlung mit Tenofoviridisoproxil

Abschätzung der Kreatinin-Clearance aus der Serum-Kreatinin-Konzentration



Beispiel: 60 kg schwere Frau, 40 Jahre alt, Serumkreatinin 2,0 mg / 100 ml


Vorgehen: Stelle unter ① Gewicht 60 kg das ② Alter 40 Jahre; ohne weitere Verschiebung kann nun unter ③ Serumkreatinin bei 2,0 mg / 100 ml die ④ Kreatinin-Clearance von 36 ml / min abgelesen werden.

* Quelle: Modifiziert nach Parmar MS:
Chronic renal disease. BMJ 2002; 325:85-90

Männer

Behandlung mit Tenofoviridisoproxil

Abschätzung der Kreatinin-Clearance aus der Serum-Kreatinin-Konzentration



Beispiel: 60 kg schwerer Mann, 40 Jahre alt, Serumkreatinin 2,0 mg / 100 ml

Vorgehen: Stelle unter ① Gewicht 60 kg das ② Alter 40 Jahre; ohne weitere Verschiebung kann nun unter ③ Serumkreatinin bei 2,0 mg / 100 ml die ④ Kreatinin-Clearance von 42 ml / min abgelesen werden.

* Quelle: Modifiziert nach Parmar MS:
Chronic renal disease. BMJ 2002; 325:85-90

SADE.GTENZ.17.06.1647f